

## Vaccins disponibles en France

Nom des vaccins	Valences vaccinales contenues dans le vaccin
Act-Hib®	Haemophilus influenzae b
Avaxim®	Hépatite A
Boostrixtetra®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche
Bexsero®	Méningocoque B
Cervarix® (vaccin bivalent)	HPV
CombAct-HIB®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche, Haemophilus influenzae b
Engerix®	Hépatite B
Fluarixtetra®	Grippe saisonnière
Gardasil® (vaccin quadrivalent)	HPV
Gardasil9® (vaccin nonavalent)	HPV
Genhevac®	Hépatite B
Havrix®	Hépatite A
HBVaxpro®	Hépatite B
Hexyon®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite B
Immugrip® /	Grippe saisonnière
Infanrix Hexa®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite B
InfanrixQuinta®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche, Haemophilus influenzae b
InfanrixTetra®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche
Influvac®/Influvac tetra®	Grippe saisonnière
Menjugate®	Méningocoque C
Menveo®	Méningocoque A, C, Y, W135
M-M-RVaxPro®	Rougeole, Oreillons, Rubéole

Nom des vaccins	Valences vaccinales contenues dans le vaccin
Neisvac®	Méningocoque C
Nimenrix®	Méningocoque A, C, Y, W135
Pentavac®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche, Haemophilus influenzae b
Pneumovax®	Pneumocoque
Prevenar 13®	Pneumocoque
Priorix®	Rougeole, Oreillons, Rubéole
Repevax®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche,
Revaxis®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u>
Tétravac-acellulaire®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche
Twinrix®	Hépatite A, Hépatite B
Vaxelis®	<u>Diphtérie</u> , <u>Tétanos</u> , <u>Poliomyélite</u> , Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite B
Vaqta®	Hépatite A

## Vaccins disponibles sur le marché en 2018

Valences vaccinales contenues dans le vaccin	Noms commerciaux des vaccins
Diphtérie / Tétanos / Poliomyélite	Revaxis® (valences dTP)
Diphtérie / Tétanos / Coqueluche / Poliomyélite	Enfants (valences DTCaP) : InfanrixTetra® / Tétravac-acellulaire® Adolescents et adultes (valences dTcaP) : Boostrixtetra® / Repevax®
Diphtérie / Tétanos / Coqueluche / Poliomyélite / <i>Haemophilus influenzae b</i>	InfanrixQuinta®Pentavac®
Diphtérie / Tétanos / Poliomyélite / Coqueluche / <i>Haemophilus influenzae b</i> / Hépatite B	Infanrix Hexa® Hexyon® Vaxelis®
Grippe saisonnière	Immugrip® / Influvac® / Vaxigrip® Fluarixtetra® Vaxigriptetra® Influvac tetra®
<i>Haemophilus influenzae b</i>	Act-Hib®
Hépatite A	Enfants (12 mois à 15 ans) : Havrix® / Avaxim®
Hépatite B	Enfants : Engerix® B10 µg / HBVaxpro® 5 µg
Hépatite A & Hépatite B	Enfants (entre 1 et 15 ans) : Twinrix® Enfant
Méningocoque A, C, Y, W	À partir de l'âge de 6 semaines : Nimenrix® À partir de l'âge de 2 ans : Menveo®
Méningocoque C	Menjugate® / Neisvac® (vaccins conjugués)
Méningocoque B	Bexsero®
Papillomavirus humains (HPV)	Cervarix® (vaccin bivalent) Gardasil® (vaccin quadrivalent) Gardasil9® (vaccin nonavalent)
Pneumocoque	Prevenar 13® (conjugué) Pneumovax® (non conjugué)
Rougeole / Oreillons / Rubéole	M-M-RVaxPro® Priorix®

# Vaccination : êtes-vous à jour ?

## 2018 calendrier simplifié des vaccinations

Âge approprié	VACCINATIONS OBLIGATOIRES pour les nourrissons nés à partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2018								6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +	
	1 mois	2 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois								
BCG															
Diphthérie-Tétanos-Poliomyélite															Tous les 10 ans
Coqueluche															
Haemophilus Influenzae de type b (HIB)															
Hépatite B															
Pneumocoque															
Méningocoque C															
Rougeole-Oreillons-Rubéole															
Papillomavirus humain (HPV)															
Grippe															Tous les ans
Zona															

**TABLEAU DES VACCINS RECOMMANDES CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES ADULTES EN 2018**

vaccins contre	11-13 ans	15 ans	19 ans	25 ans
diphtérie (D), Tétanos (T), Poliomyélite inactivé (Polio ), coqueluche acellulaire (ca)	X			X
Papillomavirus humains (HPV)	2 doses (schéma 0, 6 mois)	3 doses (schéma 0,1 ou 2,6 mois selon le vaccin utilisé)		
Hépatite B	2 doses (schéma 0, 6 mois)		3 doses (schéma 0,2,6 mois)	
Méningite C (vaccin conjugué)	1 dose jusqu'à 24 ans en l'absence de vaccination avant 11 ans [1]			
Rougeole, Oreillons, Rubéole	2 doses à au moins 1 mois d'intervalle si pas de vaccin antérieur ; 1 dose si une seule dose vaccinale antérieur			

Lorsqu'un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n'est pas nécessaire de recommencer tout le schéma vaccinal ce qui imposerait des injections répétées. Il suffit de reprendre ce schéma au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en tenant compte du nombre de doses manquantes et de l'âge de la personne.

Pour plus d'information : [https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2018-02/calendrier\\_vaccinations\\_2018.pdf](https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2018-02/calendrier_vaccinations_2018.pdf)